

大腸癌

プログラム名	薬剤名	タイプ	基準値
XELOX	IL7° フット注射用100mg セ°ロ°タ°錠300	体表面積別 体表面積別	130m g 2000m g
XELOX+bevacizumab	アハ° スチ点滴静注用 IL7° フット注射用100mg セ°ロ°タ°錠300	体重別 体表面積別 体表面積別	7.5m g 130m g 2000m g
XELODA+bevacizumab	アハ° スチ点滴静注用 セ°ロ°タ°錠300	体重別 体表面積別	7.5m g 2000m g
mFOLFOX6	レホ° リナト点滴静注用 IL7° フット注射用 5-FU注 (bolus) 5-FU注 協和	体表面積別 体表面積別 体表面積別 体表面積別	200m g 85m g 400m g 2400m g
mFOLFOX6+bevacizumab	アハ° スチ点滴静注用 レホ° リナト点滴静注用 IL7° フット注射用 5-FU注 (bolus) 5-FU注 協和	体重別 体表面積別 体表面積別 体表面積別 体表面積別	5 or 10m g 200m g 85m g 400m g 2400m g
mFOLFOX6+Panitumumab	ヘ° クレ化° ックス点滴静注 レホ° リナト点滴静注用 IL7° フット注射用 5-FU注 (bolus) 5-FU注 協和	体重別 体表面積別 体表面積別 体表面積別 体表面積別	6m g 200m g 85m g 400m g 2400m g
mFOLFOXIRI+Panitumumab	ヘ° クレ化° ックス点滴静注 トホ° テン点滴静注 レホ° リナト点滴静注用 IL7° フット注射用 5-FU注	体重別 体表面積別 体表面積別 体表面積別 体表面積別	6m g 150m g 200m g 85m g 3000m g
FOLFOXIRI+bevacizumab	アハ° スチ点滴静注用 トホ° テン点滴静注 レホ° リナト点滴静注用 IL7° フット注射用 5-FU注 bolus	体重別 体表面積別 体表面積別 体表面積別 体表面積別	5 or 10mg 165m g 200m g 85m g 3200m g
FOLFOXIRI	トホ° テン点滴静注 レホ° リナト点滴静注用 IL7° フット注射用 5-FU注 bolus	体表面積別 体表面積別 体表面積別 体表面積別	165m g 200m g 85m g 3200m g
SOX	イソワタ体約配合OD錠 IL7° フット注射用100mg	体表面積別 体表面積別	80m g 130m g
SOX+bevacizumab	アハ° スチ点滴静注用 IL7° フット注射用100mg イソワタ体約配合OD錠	体重別 体表面積別 体表面積別	7.5m g 130m g 80m g
S1「タ体約」+bevacizumab	アハ° スチ点滴静注用 イソワタ体約配合OD錠	体重別 体表面積別	7.5m g 80m g
RPMI+bevacizumab	レホ° リナト点滴静注用 5-FU注 bolus アハ° スチ点滴静注用	体表面積別 体表面積別 体重別	250m g 600m g 5 or 10mg
RPMI	レホ° リナト点滴静注用 5-FU注 bolus	体表面積別 体表面積別	250m g 600m g
irinotecan+Cetuximab	アーヒ° ックス注射液 トホ° テン点滴静注	体表面積別 体表面積別	400→250mg 150m g
irinotecan+Panitumumab	ヘ° クレ化° ックス点滴静注 トホ° テン点滴静注	体重別 体表面積別	6m g 150m g
SIR	イソワタ体約配合OD錠 トホ° テン点滴静注	体表面積別 体表面積別	80m g 150m g
SIRB	イソワタ体約配合OD錠 アハ° スチ点滴静注用 トホ° テン点滴静注	体表面積別 体重別 体表面積別	80m g 7.5m g 150m g
FOLFIRI	レホ° リナト点滴静注用 トホ° テン点滴静注 5-FU注 (bolus) 5-FU注 協和	体表面積別 体表面積別 体表面積別 体表面積別	200m g 150m g 400m g 2400m g
FOLFIRI + Aflibercept	ザ° ルトッア° 点滴静注 レホ° リナト点滴静注用 トホ° テン点滴静注 5-FU注 bolus 5-FU注 協和	体重別 体表面積別 体表面積別 体表面積別 体表面積別	4m g 200m g 150m g 400m g 2400m g
FOLFIRI+bevacizumab	アハ° スチ点滴静注用 レホ° リナト点滴静注用 トホ° テン点滴静注 5-FU注 (bolus) 5-FU注 協和	体重別 体表面積別 体表面積別 体表面積別 体表面積別	5 or 10m g 200m g 150m g 400m g 2400m g
FOLFIRI+Cetuximab	アーヒ° ックス注射液 レホ° リナト点滴静注用 トホ° テン点滴静注	体表面積別 体表面積別 体表面積別	400→250mg 200m g 150m g

	5-FU注 bolus	体表面積別	400m g
	5-FU注 協和	体表面積別	2400m g
FOLFIRI+Panitumumab	ペグ化 [®] タキス点滴静注	体重別	6m g
	レ [®] リナト点滴静注用	体表面積別	200m g
	ト [®] テシ点滴静注	体表面積別	150m g
	5-FU注 bolus	体表面積別	400m g
	5-FU注 協和	体表面積別	2400m g
FOLFIRI+Ramucirumab	サイムザ [®] 点滴静注液	体重別	8m g
	レ [®] リナト点滴静注用	体表面積別	200m g
	ト [®] テシ点滴静注	体表面積別	150m g
	5-FU注 bolus	体表面積別	400m g
	5-FU注 協和	体表面積別	2400m g
XELIRI	セ [®] ロ [®] タ錠300	体表面積別	1600m g
	ト [®] テシ点滴静注	体表面積別	200m g
XELIRI+bevacizumab	セ [®] ロ [®] タ錠300	体表面積別	1600m g
	アバ [®] スチ点滴静注用	体重別	7.5m g
	ト [®] テシ点滴静注	体表面積別	200m g
UFT/LV	1-エフィ配合顆粒T	体表面積別	300m g
UFT/LV+Bevacizumab	アバ [®] スチ点滴静注用	体重別	5 or 10m g
	1-エフィ配合顆粒T	体表面積別	300m g
FTD/TPI	ロサ [®] フ配合錠	体表面積別	35m g
FTD/TPI+Bevacizumab	アバ [®] スチ点滴静注用	体重別	7.5m g
	ロサ [®] フ配合錠	体表面積別	35m g
XELODA	セ [®] ロ [®] タ錠300	体表面積別	2000m g
XELODA(術後補助化学療法)	セ [®] ロ [®] タ錠300	体表面積別	2500m g
S-1	エウタ [®] 配合OD錠	体表面積別	80m g
ヒ [®] ラフトヒ [®] +メクトヒ [®] +ア [®] -ヒ [®] タックス	メクトヒ [®] 錠15mg	体表面積別	90mg
	ヒ [®] ラフトヒ [®] カ [®] セル75mg	体表面積別	300mg
	ア [®] -ヒ [®] タックス注射液	体表面積別	400→250mg
ヒ [®] ラフトヒ [®] +ア [®] -ヒ [®] タックス	ヒ [®] ラフトヒ [®] カ [®] セル75mg	体表面積別	300mg
	ア [®] -ヒ [®] タックス注射液	体表面積別	400→250mg
スチバーガ	スチバ [®] -カ [®]	個体別	80mg