

## 胆・肝・膵臓癌

| プロトコル名            | 薬剤名                               | タイプ       | 基準値     |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| GEM+nab-PTX       | アブラキサン点滴静注用<br>ゲムシタビン注射用          | 体表面積別     | 125m g  |
|                   |                                   | 体表面積別     | 1000m g |
| FOLFIRINOX        | イルプラット注射用                         | 体表面積別     | 85m g   |
|                   | イレキリット点滴静注用                       | 体表面積別     | 200m g  |
|                   | トプテシ点滴静注                          | 体表面積別     | 180m g  |
|                   | 5-FU注 bolus                       | 体表面積別     | 400m g  |
|                   | 5-FU注                             | 体表面積別     | 2400m g |
| GEM               | ゲムシタビン注射用                         | 体表面積別     | 1000m g |
| GEM+S1            | Iリクタイウ配合OD錠<br>ゲムシタビン注射用          | 体表面積別[範囲] | 80m g   |
|                   |                                   | 体表面積別     | 1000m g |
| GEM+CDDP（CDDP低用量） | リクダ注<br>ゲムシタビン注射用                 | 体表面積別     | 25m g   |
|                   |                                   | 体表面積別     | 1000m g |
| オニバイド             | オニバイド点滴静注<br>イレキリット点滴静注用<br>5-FU注 | 体表面積別     | 70m g   |
|                   |                                   | 体表面積別     | 200m g  |
|                   |                                   | 体表面積別     | 2400m g |
| GEM+S1+CDDP       | Iリクタイウ配合OD錠<br>ゲムシタビン注射用<br>リクダ注  | 体表面積別[範囲] | 80m g   |
|                   |                                   | 体表面積別     | 1000m g |
|                   |                                   | 体表面積別     | 25m g   |
| S1                | Iリクタイウ配合OD錠                       | 体表面積別[範囲] | 80m g   |